

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

19358-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 260 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG6798

GenBank-Zugangsnummer:

BC063435

GeneID (NCBI):

3054

Vollständiger Name:

host cell factor C1 (VP16-accessory protein)

Berechnete Masse:

209 kDa

Beobachtete Masse:

230 kDa, 300 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, A431-Zellen, Jurkat-Zellen

IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes Nierengewebe

Hintergrundinformationen

Host cell factor 1 (HCFC1), also known as HCF-1, is a transcriptional co-regulator with a proteolytic cleavage at the PRO repeats that could be cleaved by O-GlcNAc transferase (OGT) to produce a heterodimeric complex of HCFC1N and HCFC1C subunits (PMID: 23539139). HCFC1 was first identified in herpes simplex virus transcription while it lacks a DNA binding domain. HCFC1 is not a traditional transcription factor, it interacts with multiple protein including transcription factors to regulate many biological processes, such as cell proliferation, migration, cell death and mitochondrial biogenesis (PMID: 25281006). Mutation in HCFC1 was related to an X-linked recessive disease --- cblX with a complex clinical manifestation involved in error of metabolism, neurocognitive impairment and craniofacial abnormalities (PMID: 24011988; PMID: 25281006).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Erina Minato	31758567	Microbiol Immunol	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
 W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19358-1-AP (HCFC1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 19358-1-AP (HCFC1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 19358-1-AP (HCFC1 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).