

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

67120-1-Ig

Größe:

150ul, Konzentration: 2000 µg/ml von 9118

Nanodrop und 1000 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Maus

Isotyp:

IgG2a

Immunogen Katalognummer:

AG13655

GenBank-Zugangsnummer:

BC006359

GeneID (NCBI):

von 9118

Vollständiger Name:

internexin neuronal intermediate filament protein, alpha

Berechnete Masse:

55 kDa

Beobachtete Masse:

60-66 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

3C12A8

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:300-1:1200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Hausschwein, Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: fetales humanes Hirngewebe, Hausschwein-Hirngewebe, Maushirngewebe, Ratten-Cerebellum-Gewebe, Rattenhirngewebe

IHC: humanes Pankreaskarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

INA, also named as Alpha internexin, is a 66 kDa intermediate filament protein which is involved in the morphogenesis of neurons. INA is mainly expressed in various kinds of central and peripheral neurons from early development and highly expressed in neurodegenerative and neuronal death cells. The MW of INA ranges from 60 kDa in human, pig and mouse to 66 kDa in rat. (PMID: 29940892, 2201753)

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67120-1-Ig (INA antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67120-1-Ig (INA antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 67120-1-Ig (INA antibody) at dilution of 1:600 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).