

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SERPING1/C1 Inactivator



Numéro de catalogue: 12259-1-AP

9 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

12259-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG2819

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011171

Identification du gène (NCBI):

710

Nom complet:

serpin peptidase inhibitor, clade G (C1 inhibitor), member 1

MW calculé

500 aa, 55 kDa

MW observés:

100 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IHC 1:50-1:500

IF 1:200-1:800

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : plasma humain, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules L02, tissu hépatique de souris, tissu hépatique humain, tissu urinaire humain

IHC : tissu d'amygdalite humain,

IF : cellules HepG2,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

SERPING1, also known as C1 Inhibitor (C1INH), is a member of the Serine proteinase inhibitor family. Its main function is the inhibition of the complement system to prevent spontaneous activation. It inhibits activated C1r and C1s of the first complement component and thus regulates complement activation. Deficiency of this protein is associated with hereditary angioneurotic oedema (HANE). C1INH is the most heavily glycosylated plasma protein. Of its 95-105 kDa apparent molecular mass, the protein moiety of 500 aa accounts for only 55 kDa. The native 105 kDa form of C1INH could be cleaved into 60-65 kDa fragments.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Daria Zamolodchikov	26613657	J Thromb Haemost	WB
Koji Abe	31771070	J Alzheimers Dis	IHC
Dorit Farfara	30882931	Glia	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12259-1-AP (SERPING1/C1 Inactivator antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12259-1-AP (SERPING1/C1 Inactivator antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12259-1-AP (SERPING1/C1 Inactivator antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using SERPING1/C1 Inactivator antibody (12259-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).