

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HIC1



Numéro de catalogue: 24949-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24949-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21849

Numéro d'acquisition GenBank:

BC157027

Identification du gène (NCBI):

3090

Nom complet:

hypermethylated in cancer 1

MW calculé

714 aa, 75 kDa

MW observés:

65-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules NIH/3T3

IHC : tissu testiculaire humain, tissu de côlon humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Junqiang Liu	35501800	Cancer Cell Int	WB, IHC
Huan Wang	35071242	Front Cell Dev Biol	WB
Yanlin Wu	37388742	Front Immunol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24949-1-AP (HIC1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 24949-1-AP (HIC1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 24949-1-AP (HIC1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).